

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO VETERINARIO,
NO ES MEDICAMENTO VETERINARIO

1. GENERALIDADES

- 1.1. Nombre comercial: HEMATOFOS B12® AC OS
- 1.2. Clase de uso: Reconstituyente Multivitamínico Complementado con Fósforo.
- 1.3. Formulación: Solución oral.

2. COMPOSICION

Ingredientes:

Cada 1 L de HEMATOFOS B12® AC OS contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
DL-Metionina	10 000	mg
L-Histidina	5000	mg
L-Triptofano	2500	mg
Vitamina B12 (cianocobalamina)	11	mg
Vitamina B2 (riboflavina fosfato sódico)	2000	mg
Vitamina B3 (nicotinamida)	50 000	mg
Vitamina B6 (piridoxina clorhidrato)	10 000	mg
Citrato de hierro amoniacal verde	20 000	mg
Cobalto (acetato de cobalto tetrahidrato)	120	mg
Glicerofosfato sódico	10 000	mg
Excipientes c.s.p.	1	L

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. Aspecto: Solución translúcida.
- 3.2. Color: Ámbar a pardo rojizo.

4. DESCRIPCIÓN

Asociación multi-reconstituyente de vitaminas del complejo B, minerales y aminoácidos.

5. INDICACIONES

Prevención, tratamiento de todo tipo de anemias. Reconstituyente general, enflaquecimiento, debilidad, alta producción, situaciones de estrés, inapetencia, fracturas, intoxicaciones, agotamiento sexual, caída de plumas. Potente estimulante del apetito y del crecimiento, aumenta la producción y mejora el aspecto de animales de exposición.

6. ESPECIES DE DESTINO

Aves y cerdos.

HEMATOFOS B12® AC OS

Página 2 de 2

7. ADMINISTRACIÓN

Vía oral en agua de bebida.

8. DOSIS

Aves:

Crianza ornamental y casera:

5 a 10 gotas para 100 mL de agua de bebida

Comercial:

Pollos de engorde: para acelerar el crecimiento y estimular el aumento de peso, la dosis recomendada es de 0.13 a 0.25 mL/kg de peso vivo.

Considerando el consumo promedio de agua en pollos de engorde (25 mL/0.5 kg/día), esta dosis corresponde a 0.5 a 1 mL de HEMATOFOS B12® AC OS por cada 200 mL de agua (0.5 a 1 litro/200 litros agua) durante los primeros 3 días a la recepción del lote y durante los 2 (dos) primeros días al iniciar la cuarta semana.

Otras aves:

1 litro/200 - 400 litros de agua, de acuerdo al criterio del Médico Veterinario donde la dosis más alta puede ser usada en casos graves. El agua de bebida deberá ser usada en las próximas 24 horas.

Cerdos:

5 mL/ 20 kg de peso vivo

9. PRECAUCIONES

No precisa precauciones especiales.

10. CONTRAINDICACIONES

Ninguna

11. PERIODO DE RETIRO

No requiere

12. ALMACENAMIENTO

Consérvese el envase dentro de la caja de cartón protegido de la luz y a temperatura ambiente entre 10°C y 30°C.

Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

13. PRESENTACIÓN

Frasco x 10mL, 20mL, 50mL, 100mL, 250mL, 500mL y 1000mL.