

Aminoforte® F

REGISTRO Q-0616-044

Fuente de electrolitos, glucosa, vitaminas, agua y aminoácidos en alta concentración

Solución Inyectable

USO VETERINARIO

Formulación

Cada 100 ml contiene:	
Dextrosa	5 g
Cloruro de calcio	15 mg
Cloruro de potasio	20 mg
Sulfato de magnesio	20 mg
Acetato de sodio 3H ₂ O	250 mg
L-Histidina (como clorhidrato)	27.5 mg
DL- Metionina	34 mg
DL-Triptófano	34 mg
L-Cisteína (como clorhidrato)	26.1 mg
L- Treonina	68 mg
DL-Isoleucina	68 mg
L-Arginina (como clorhidrato)	70.3 mg
DL-Fenilalanina	102 mg
DL-Valina	170 mg
L-Lisina (como clorhidrato)	81.6 mg
L-Leucina	136 mg
Glutamato monosódico	136 mg
Vit. B ₁ (Tiamina HCl)	8.9 mg
Vit. B ₂ (Riboflavina 5 Fosfato)	2.9 mg
Vit. B ₆ (Piridoxina HCl)	8.2 mg
Vit. B ₁₂ (Cianocobalamina)	5 mcg
Nicotinamida	150 mg
Excipientes c.b.p.	100 mL

Fórmula Garantizada

Cada 100 ml contiene:	
Vitamina B ₁ (Tiamina HCl)	8.9 mg
Vitamina B ₂ (Riboflavina 5 fosfato)	2.9 mg
Nicotinamida	150 mg
Vitamina B ₆ (Piridoxina HCl)	8.2 mg
Vitamina B ₁₂ (Cianocobalamina)	0.005 mg
Nitrógenos totales	168.05 mg
Dextrosa	5000 mg
Sodio	60.92 mg
Calcio	4.09 mg
Magnesio	4.04 mg
Potasio	10.49 mg
Excipientes c.b.p.	100 mL

Propiedades

Aminoforte® F es una solución inyectable acuosa estéril de alta concentración que constituye una fuente adecuada de aminoácidos, electrolitos, vitaminas y azúcares que restaura el equilibrio vital necesario para recuperar a los animales en situaciones de emergencia.

Aminoforte® F contiene diez aminoácidos esenciales descritos para la nutrición animal, además de presentar ácido glutámico y cisteína. En ruminantes, los microorganismos del rumen son capaces de sintetizar tales moléculas aunque es necesario un aporte de tales sustancias para conseguir los máximos ritmos de crecimiento o de producción de leche.

Las vitaminas del complejo B y la nicotinamida; son vitaminas hidrosolubles que no se retienen en el organismo en cantidades apreciables, por lo que resulta necesario un aporte exógeno, principalmente cuando existen situaciones fisiológicas o patológicas especiales. Estas vitaminas intervienen en innumerables funciones

metabólicas, participan en el correcto funcionamiento del sistema nervioso y resultan esenciales para la producción de glóbulos rojos y para la síntesis de ADN. Tal y como ocurre con los aminoácidos esenciales, los microorganismos presentes en el rumen son capaces de sintetizar estas vitaminas en cantidades adecuadas para el metabolismo normal del hospedador y para una concentración adecuada en la leche; a pesar de ello, en ciertas condiciones, pueden producirse deficiencias en tiamina y cianocobalamina.

Los electrolitos presentes en **Aminoforte® F** proporcionan al organismo los elementos que se pierden con mayor facilidad en los periodos de deshidratación. La glucosa es la fuente de energía básica y de rápida utilización, por ello su administración por vía parenteral, en forma de solución, constituye un aporte de energía fundamental en estados carenciales y/o patológicos en los que la ingesta oral se halla disminuida o impedida.

Indicaciones

Como fuente inmediata de aminoácidos, dextrosa, vitaminas del complejo B y electrolitos para el tratamiento de estados agudos de convalecencia de animales debilitados o sometidos a esfuerzos intensos, stress, shock, deshidratación, enfermedades crónicas, parasitosis y como terapia de apoyo en casos de deshidratación severa por vómitos o diarreas donde ayude a reponer la pérdida de electrolitos y proteínas (en este caso es necesario además la fluidoterapia oral o parenteral).

Dosis y Vía de Administración

Se aconseja la administración de 1 mL por cada 5 kg de peso vivo, entre 1 y 3 veces al día, según la gravedad del caso y criterio facultativo. Se puede realizar la administración por vía intravenosa, intramuscular, subcutánea o intraperitoneal en bovinos, camélidos, ovinos, porcinos, caninos y felinos; en equinos se recomienda utilizar únicamente la vía intravenosa.

La administración de **Aminoforte® F** no excluye el tratamiento específico del estado patológico que afecte al animal.

Especies de Destino

Bovinos (carne y leche), ovinos, porcinos, equinos, caninos y felinos.

Tiempo de Retiro

No presenta periodo de retiro.

Contraindicaciones

- No se han descrito contraindicaciones durante la preñez y lactación.
- No administrar a animales con historial conocido de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.
- Pueden aparecer signos de dolor y vómitos si se administra a una velocidad de infusión excesivamente rápida. En tal caso, se debe suspender la administración hasta que desaparezcan los signos y entonces podrá reiniciarse la infusión de forma más lenta.

Reacciones Adversas

- Se puede manifestar con muy poca frecuencia reacciones de hipersensibilidad; si aparecieran, interrumpir el tratamiento.
- La reacción local (hinchazón) puede ocurrir en el lugar de la inyección en los animales hasta una semana después de la administración.
- Durante la administración intravenosa puede presentarse shock. En este caso se suspenderá la medicación y se tomarán las medidas apropiadas.

Precauciones Específicas que Debe Tomar la Persona que Administre el Medicamento a los Animales

- No manipular este producto si sabe que es sensible o si se le ha aconsejado no trabajar con tales preparaciones.
- Maneje este producto con gran cuidado para evitar la exposición, tomando todas las precauciones recomendadas.
- Si aparecen síntomas después de la exposición, como una erupción en la piel, debe buscar consejo médico y mostrar al médico esta advertencia. Hinchazón de la cara, labios u ojos o dificultad para respirar son síntomas más graves y requieren atención médica urgente.

Interacciones

No se han descrito.

Sobredosificación

Dada la inocuidad de sus componentes, resulta improbable que se produzca sobredosificación, aunque en tal caso se recomienda suspender la administración e instaurar el tratamiento sintomático oportuno.

Advertencias

- La administración debe realizarse a velocidad de infusión lenta y siguiendo las medidas de precaución asépticas normales para la administración de soluciones por vía parenteral.
- En el caso de la administración subcutánea, inyectar un máximo de 25 mL por punto de aplicación.
- En tratamientos prolongados, se recomienda realizar frecuentes controles del balance hidroelectrolítico.
- Agrovvet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.

Conservación

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre 8°C y 30°C. No congelar. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

Presentación comercial

Frascos x 100 mL, 250 mL, 500 mL y 1 L.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

México: REGISTRO Q-0616-044

Aminoforte® es una marca registrada de Agrovvet Market S.A.

Tel: (511) 2 300 300
Email: ventas@agrovvetmarket.com
Web: www.agrovvetmarket.com

Elaborado por: Pharmadix Corp. S.A.C. Calle Santa Lucía 220
Urb. Aurora- Ate, Lima-Perú Para: Agrovvet Market S.A.
Av. Canadá 3792-3798, San Luis. Lima 30 - Perú

Importado y Distribuido por: VETERMEX Animal Health S.A.
de C.V. Calle: La Brida # 247 Interior 1. Colonia: López Cotilla.
Tlaquepaque. Jalisco. México CP 45615.

42016MEX00001 V04.1021

Agrovvet
MARKET