



FBZ® 12.5% con minerales

REGISTRO Q-0616-020

Antiparasitario interno

Suspensión Oral

USO VETERINARIO

Formulación

Cada 100 mL contiene:	
Fenbendazole	12.5 g
Sulfato de Cobalto	1.6 g
Carbonato de Zinc	0.6 g
Selenito de Sodio	0.3 g
Excipientes c.s.p	100 mL

Indicaciones

FBZ® 12.5% con minerales, es un antiparasitario de amplio espectro; para el tratamiento de las parasitosis internas de bovinos, equinos, ovinos y caprinos; incluyendo casos de teniasis. Incluye en su fórmula minerales con acción directa en la prevención de anemias (cobalto), en la mejora del pelaje, piel y lana (zinc) y mejora en la reproducción (selenio).

Su acción incluye formas maduras e inmaduras (incluyendo estadios inhibidos y huevos) de:

- Gusanos del estómago: *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp. y *Trichostrongylus axei*.
- Intestinales: *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Bunostomum* spp., *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides* spp., *Ostertagia* spp. (incluidos sus estados hipobioticos), entre otros.
- Pulmonares: *Dictyocaulus* spp.
- Tenias: *Moniezia* spp.

Dosificación

Via oral. Como dosis única, cada 3 meses dependiendo de las necesidades y recomendaciones del médico tratante. En equinos, en presencia de gusanos del pulmón o larvas migrantes aplicar hasta por 5 días seguidos, según la recomendación del médico veterinario tratante.

Bovinos de toda raza: Nematodos gastrointestinales y pulmonares: 1 mL/25 kg (5 mg/kg). Tenias: 1 mL/12.5 kg (10 mg/kg). Larvas *Ostertagia* tipo II (hipobioticas): 1 mL/16 kg de peso vivo (7.5 mg/kg).

Ovinos y caprinos: Nematodos gastrointestinales y pulmonares: 1 mL/25 kg (5 mg/kg). Tenias: 1 mL/12.5 kg (10 mg/kg). Larvas *Ostertagia* tipo II (hipobioticas): 1 mL/16 kg de peso vivo (7.5 mg/kg).

Equinos: 1 mL/16 kg de peso vivo (7.5 mg/kg).

Periodo de Retiro

Carne: 14 días

Leche: 3 días.

Contraindicaciones, efectos no deseados y precauciones

- No se administre en equinos destinados para consumo humano.
- No se han reportado contraindicaciones ni limitaciones de uso cuando el producto se administra en la dosis recomendada. El producto es muy bien tolerado. Es compatible con otros antihelmínticos.
- No administrar conjuntamente con los derivados bromados de la salicililalidad.
- No se recomienda su uso en animales debilitados, muy parasitados o en simultáneo con otras medicaciones, baños o vacunaciones.
- Agítese antes de usar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.

Almacenamiento

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Almacenar entre 8° y 30° C.

Presentación comercial

Frasco x 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 Litro y 3.9 Litros. Jeringa dosifácil x 30 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Reg. SENASA Perú: F.08.02.N.0411; Reg. Ecuador: 3A1-10452-AGROCALIDAD; Reg. Guatemala: PE200-42-10-5135; Reg. Honduras: PF-5104; Reg. Nicaragua: 8167; Reg. Panamá: RF-7551-15; Reg. Venezuela: INSAI2041P133N071340; México: REGISTRO: Q-0616-020

FBZ® es una marca registrada de Agrovet Market S.A.

Tel: (51) 2 300 300
Email: ventas@agrovetmarket.com - Web: www.agrovetmarket.com

Elaborado por: Pharmadix Corp. S.A.C. Calle Santa Lucía 220 Urb. Aurora-Ate, Lima-Perú

Para: Agrovet Market S.A. Av. Canadá 3792-3798, San Luis. Lima 30 - Perú.

Importado y Distribuido por: Vetemex Animal Health S.A. de C.V.

Calle: La Breda # 247 Interior 1. Colonia: López Cotilla. Tlaquepaque, Jalisco. México CP 45615.

V5.6921 42109MEX0001