

FICHA TÉCNICA

1. GENERALIDADES

- 1.1. **Nombre comercial** : TYLVAX® Px
1.2. **Clase de uso** : Antibiótico
1.3. **Formulación** : Premezcla

2. COMPOSICIÓN

Cada 100 g de TYLVAX® Px contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Tilvalosina (acetilisovaleriltilosina) como tartrato	5	g
Excipientes c.b.p.	100	g

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. **Aspecto:** Polvo homogéneo libre de impurezas visibles.
3.2. **Color:** Blanco cremoso.

4. DESCRIPCIÓN

TYLVAX® Px es un antibiótico oral macrólido de flujo libre para la medicación del alimento. Provee 50 mg/g de actividad y es muy eficaz frente a diferentes enfermedades importantes en porcinos y aves (pollos de engorda y pavos). Tylvax® Px actúa contra microorganismos Gram positivos y algunos Gram negativos y ofrece una excepcional actividad antimicoplásmica. Su eficacia es hasta diez veces mayor que la tilosina.

5. INDICACIONES

Tratamiento terapéutico y metafiláctico de las enfermedades respiratorias y entéricas causadas por microorganismos sensibles a la tilvalosina, principalmente:

Cerdos:

Micoplasmosis, neumonía micoplásmica (enzoótica) causada por *M. hyopneumoniae*, Enteropatía proliferativa Porcina (EPP), ileítis porcina causada por *Lawsonia intracellularis*, Disentería porcina, causada por *Brachyspira hyodysenteriae*, Colitis Porcina, causada por *Brachyspira pilosicoli*.

agrovvetmarket.com

Pollos de engorda y Pavos:

Enfermedad respiratoria crónica (CRD), saculitis aérea y sinusitis infecciosa causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae* y *Mycoplasma meleagridis* (pavos). Enteritis necrótica asociada a *Clostridium perfringens*, enteritis bacterianas. ORT (*Ornithobacterium rhinotracheale*).

6. ESPECIES DE DESTINO

Pollos de engorda, pavos y porcinos

7. ADMINISTRACIÓN

Vía oral mezclado en el alimento.

8. DOSIS

Porcinos:

Metafiláctico: 40 - 100 g/100 kg de alimento durante 21 días o hasta finalizar el período de riesgo.

Terapéutico: 100-200g/100 kg de alimento por 10 a 14 días.

Aves (Pollos y Pavos):

Metafiláctico: 40 - 100 g/100 kg de alimento durante los primeros 7 días.

Terapéutico: 100-200g/100 kg de alimento por 7 a 10 días. En períodos de estrés por 5 a 7 días adicionales.

Tylvax® Px deberá mezclarse con al menos el 5% de alimento a dosificar y luego ser incorporado a la totalidad del mismo. El alimento que contiene la premezcla deberá administrarse como única ración durante los períodos antes recomendados. Se ha demostrado la sinergia entre la tilvalosina y las tetraciclinas y se ha demostrado la eficacia de la combinación de clortetraciclina y la tilvalosina en dosis menores (**Tylvax® Px**) en programas realizados en el campo. Consulte a su veterinario antes de iniciar cualquier tratamiento.

9. PRECAUCIONES

- No existen interacciones ni reacciones adversas conocidas.
- Evitar en animales con historial de hipersensibilidad.

agrovvetmarket.com

- Cuando se mezcle el medicamento veterinario y manipule el alimento medicado, se debe evitar el contacto directo con ojos, piel y mucosas.
- Lavar manos y la piel expuesta después del uso.
- En caso de contacto con los ojos, inmediatamente enjuagar con abundante agua.
- En caso de ingestión accidental consulte inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.

10. CONTRAINDICACIONES

- Las personas con una conocida hipersensibilidad al tartrato de tilvalosina deben evitar cualquier contacto con el producto.
- Si aparecen síntomas después de la exposición, como una erupción en la piel, debe buscar consejo médico y mostrar al médico esta advertencia.
- Hinchazón de la cara, labios u ojos o dificultad para respirar son síntomas más graves y requieren atención médica urgente.
- No ha quedado demostrada la seguridad de la Tilvalosina durante la gestación y la lactancia en cerdas. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuado por el veterinario responsable.

11. PERIODO DE RETIRO

Porcinos: 2 días

Pollos y pavos: 2 días

No debe usarse en gallinas ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano.

12. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar seco y bien ventilado, mantener fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda utilizar todo el contenido una vez abierto.
- No deberían almacenarse bolsas abiertas.
- El alimento con el producto incorporado debería ser utilizado antes de los 30 días.

13. PRESENTACIÓN

10, 15, 50, 100, 250 g, 1, 5, 10, 20, 25 kg.